

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

D.L.P. 17-5-70 073833

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, Maison de l'Agriculture - Bât. 5 - Place Chaptal

Boîte Postale 1078 - 34 MONTPELLIER

C.C.P. MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

25 francs

N° II8 - JUIN 1970/22

2° supplément

EXECUTION DES TRAITEMENTS

Respecter les délais légaux d'emploi des pesticides.

Renouveler les traitements lavés par la pluie.

TORDEUSE ORIENTALE

La série de trois traitements doit être entreprise sur les pêches devant être récoltées entre le 15 juillet et le 31 juillet.

Exécuter le ou les traitements destinés à prévenir les dégâts sur les fruits (abricots et pêches) récoltés avant le 15 juillet.

Les abricots traités dans ces conditions seront également protégés de l'Anarsia et du Carpocapse des poires susceptibles de les attaquer.

CYLINDROSPORIOSE DU CERISIER

Après la récolte l'exécution d'un traitement fongicide est indispensable pour prévenir ou limiter la maladie.

Ce traitement aura également une efficacité contre le Gnomonia.

MOUCHE DE LA CERISE

Dans les vergers d'altitude (particulièrement en Lozère) il est nécessaire de protéger les fruits dont la récolte s'effectuera début juillet.

L.L.TROUILLON

CULTURES LEGUMIERES DE PLEIN CHAMP

AVERTISSEMENT

CHENILLE A FOURREAU DE L'ASPERGE

Compte-tenu de la biologie de ce parasite le premier traitement devra être exécuté le 25 juin. Les insecticides suivants peuvent être utilisés :

Parathion	50 g de M.A. à l'hectolitre	Fenthion	100 g de M.A. à l'hectolitre
Oléoparathion	45 g de " "	Carbaryl	150 g " "
Azinphos	40 g de " "	Lindane	75 g " "
Phosalone	120 g de " "	Carbophénothion	120 g " "
		Diethion	120 g " "

Il conviendra de faire : 2 traitements à 12 jrs d'intervalle si l'on utilise le Carbaryl, 3 traitements à 8 jours d'intervalle avec les autres insecticides.

A l'exception du Carbaryl, qui est une poudre mouillable, tous les autres insecticides devront être utilisés sous forme d'émulsion.

Les pontes et les pénétrations des jeunes larves ayant lieu à la base des turions, il faut donc traiter ces derniers au niveau du sol et obtenir la pénétration de la bouillie à 4 ou 5 cm de profondeur.

P. 424
.../...

Le traitement sera exécuté avec un pulvérisateur, sans rechercher une très forte pression, à raison de 2000 à 2500 litres de bouillie à l'hectare. Ces quantités ne constituent qu'un ordre de grandeur car l'importance du volume de bouillie peut varier selon la densité de la plantation, l'âge de l'aspergière et le nombre de turions par touffe.

Dans les plantations peu attaquées d'une superficie supérieure à 1 ou 2 ha, le traitement pourra être appliqué, par mesure d'économie, sur les 5 premières rangées de la parcelle. En effet l'infestation commence toujours par les bordures et se poursuit lentement vers l'intérieur.

INFORMATIONS

OIDIUM DU MELON -

Nous rappelons la note n° II6 , 4° supplément, du mois de mai , relative à cette maladie en recommandant aux agriculteurs d'être très vigilants car la période actuelle est très favorable à la maladie.

ROUILLE DE L'ASPERGE -

Bien que les conditions climatiques ne soient pas, en général, très favorables à la maladie, certains secteurs du littoral peuvent être soumis à des rosées matinales génératrices d'attaques de rouille. D'autre part la cueillette des asperges ayant été arrêtée plus tardivement cette année qu'en année normale la sortie de nouveaux turions et la croissance de ceux apparus antérieurement font que les traitements exécutés depuis quelques temps n'assurent généralement plus la protection désirable.

Selon les conditions climatiques, variables suivant les secteurs, les traitements doivent donc être poursuivis en utilisant un des produits recommandés dans la note n° II5 , 3° supplément du mois d'avril.

TEIGNE DU POIREAU -

Poursuivre les traitements contre ce parasite.

P. CHRESTIAN

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE

Tirage du 16 Juin 1970